

NUOVO AMBULATORIO PER IL MONITORAGGIO DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO) A SUSÀ

***È ATTIVO DA QUALCHE GIORNO PRESSO IL LABORATORIO
ANALISI DELL'OSPEDALE DI SUSÀ E SI AFFIANCA A QUELLI
DI RIVOLI, GIAVENO E AVIGLIANA***

La terapia anticoagulante orale (TAO) è sempre più utilizzata nei pazienti con fibrillazione atriale, valvulopatie, protesi valvolari, cardiopatie dilatative, post-infartuati, trombosi venose profonde. All'interno dell'ASL TO 3, questo servizio di monitoraggio della TAO è attivo da circa 15 anni presso i laboratori analisi di Rivoli e Giaveno e da qualche anno ad Avigliana. Complessivamente, gli utenti seguiti negli attuali tre centri sono circa 2500.

Da qualche giorno lo stesso ambulatorio è stato attivato anche presso il laboratorio analisi dell'ospedale di Susa e sarà seguito dalla dottoressa Fulvia Favro. I pazienti che necessitano di questa terapia potranno accedere al servizio tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9,15 presso i punti prelievo dell'ospedale di Susa e di Condove e, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, presso il punto prelievi di Oulx, muniti di due richieste mediche: una con visita di monitoraggio TAO (da 1 a 8 prestazioni) e l'altra con determinazione del PT (tempo di protrombina), sempre da 1 a 8 prestazioni. Gli esiti potranno essere ritirati, insieme allo schema terapeutico, il pomeriggio alle 14 presso il laboratorio analisi di Susa, oppure presso gli ambulatori di Condove e Oulx.

«Il trattamento anticoagulante deve essere controllato con precisione perché può essere inefficace se la dose è insufficiente e provocare rischio di trombosi e può causare emorragie se la dose è eccessiva – spiegano il dottor Giovanni Orso Giaccone, direttore del Dipartimento dei Servizi Diagnostici e la dottoressa Daniela Zanella, responsabile dei laboratori di Susa e Avigliana – Scopo fondamentale della terapia è quindi quello di deprimere, in modo controllato e reversibile, la coagulabilità del sangue per ottenere la massima protezione possibile dagli incidenti tromboembolici con il minimo rischio di emorragie. Questo grado di anticoagulazione, che varia a seconda delle differenti condizioni morbose, viene definito “range terapeutico”. Per ottimizzare l'efficacia e la sicurezza degli anticoagulanti orali occorre che i pazienti siano periodicamente controllati con il dosaggio del P. T. (tempo di protrombina) espresso in INR (valore di riferimento) e la terapia, di conseguenza, sia aggiornata periodicamente per mantenere il range terapeutico. Il laboratorio oltre a eseguire il test della coagulazione fornisce uno schema terapeutico, scritto e di facile lettura, con riportato giorno per giorno il dosaggio del farmaco sino alla data del controllo successivo. Non solo, quando il paziente ha raggiunto un valore del tempo di protrombina soddisfacente rispetto al range terapeutico e i valori si sono stabilizzati nel tempo, si ottimizzano i controlli rendendoli meno frequenti».

In tutte le sedi di ambulatorio per la TAO viene utilizzato un programma informatico che consente la gestione generale degli accessi, facilita il follow up terapeutico e consente la stampa della posologia secondo uno schema di facile lettura per l'utente.

Per informazioni i pazienti si possono rivolgere ai seguenti numeri di telefono 0122-621308 oppure 011-9360266.

Collegno, 4 giugno 2008.



ASL TO 3 - S.C. COMUNICAZIONE,URP E RELAZIONI ESTERNE

Dirigente Responsabile Dr. Mauro Deidier tel.0121 235220 fax0121 235163 email: mdeidier@asl10.piemonte.it
URP sede Collegno - Via Martiri XXX Aprile 30-10093 Collegno Tel.011 4017271/058 fax 011 4017096 urp@asl5.piemonte.it
URP sede Pinerolo - Stradale Fenestrelle 72 10064 Pinerolo Tel. 0121 235202 / 235221 urp@asl10.piemonte.it